


# 「未破裂脳動脈瘤クリッピングパス」

病棟 室

様

患者さんには、治療計画に基づいた医療をおこないます。

説明年月日： 年 月 日

項目	月 日	月 日：手術当日		月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
イベント	手術前日	術前	術後：ICU入室	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目以降	術後7日目	術後8日目	
食事	通常は21時まで食事で きます	通常は0時より飲水 できません	食事も飲水もできません 	朝より 飲水可能です 		朝より常食へ変更となります 全粥食をご希望の方はお知らせください 				
	麻酔科医師の指示に従ってください				昼食より全粥食開始になります					
清潔	制限はありません ※シャワー浴を してください 	朝の洗面後、歯ブラ シをICUへの持ち物に 入れてください 	手術のため実施できません	体拭きを行い、着替えを します 			シャワーができます ※医師が創部ガーゼを はがしたら、抜鉤前 でも洗髪できます  			
	制限はありません		手術室まで歩いて行 きます 弾性ストッキングを 着用してください 		ドレーン挿入中はベッド上で 過ごして下さい ドレーン抜去後、医師の指示 で歩行できます 初回歩行時は看護師と 一緒に歩きます 		歩行ができます また、歩行開始となったら弾性ストッキングは脱いでかまいません 			
排泄	制限はありません	手術に行く10分前 までにお手洗いを 済ませてください	尿道カテーテルを留置します	歩行ができるようになったら尿道カテーテルを抜きます。トイレに行けます						
検査 処置 点滴	採血をします 			採血をします 午前中にCT・レントゲン 施行後病棟へ戻ります 		採血をします 		創部の抜鉤 をします CT検査を します 	退院後、創部から出血した り膿が出てきた場合、外来 へ (休日、夜間は救急外来) お問い合わせください	
	手術が午後からの方 は朝から点滴をしま す		抗生剤の点滴があります		食事摂取量に合わせ点滴を調整します					
内服	担当者が内服薬の確認 をします 	当日内服指示がある 場合は、少量の水で 内服します。内服薬 は、担当の看護師が お渡しします 			医師の指示に従い、内服を開始します				退院までに担当者が、 内服薬について指導をします 	退院時、次回外来までの 内服薬を渡します
	入院中の内服は主治医の指示に従ってください									
説明	※主治医より入院時の 説明と担当看護師より 病棟内の説明をし ます ※主治医が手術の説明 をします ※夕方、麻酔科医師と 手術室看護師が病室 に説明に伺います		<p style="color: red; text-align: center;"><b>このような症状がでた際は、ナースコールでお知らせ下さい</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気持ちが悪い・息苦しい・寒気がする</li> <li>・お腹が痛い・頭痛や創痛が強くて辛い</li> <li>・手足がしびれる、力が入りにくいなどの症状</li> </ul> <p style="color: red; text-align: center;"><b>安静中の体の向き変えや腰痛等で辛い時、お知らせ下さい</b></p> 				※退院日は、治療後の身体状況を主治医が診て判断します *退院日までに主治医が病状及び今後診療について 説明します 			